CZYNNIKI RYZYKA PRÓCHNICY WIEKU WCZESNODZIECIĘCEGO

Czynniki związane z matką

- młody wiek,
- niski poziom wykształcenia,
- choroby w czasie ciąży
- zła higiena jamy ustnej

Czynniki dietetyczne:

- długi okres karmienia piersią, jeszcze po 18 m.ż.,
- długi okres karmienia butelką, w tym w nocy
- wysokie spożycie cukru w niemowlęctwie,
- jedzenie i picie (np. soków) w nocy,
- częste spożywanie słodyczy,
- jedzenie przed zaśnięciem,
- soki owocowe lub słodkie czy gazowane napoje przed zaśnięciem,
- wysoka liczba przekąsek,
- brak ustalonego czasu przekąsek,
- powyżej 6 posiłków dziennie,
- przekąski inne niż owoce (np. słodkie i tłuste),
- niskie spożycie magnezu,
- wysokie spożycie żelaza,
- dzienne spożycie cukru,
- spożycie mleka,
- częste spożywanie gazowanych napojów

Czynniki związane z dzieckiem

- wcześniactwo,
- ciąża mnoga,
- mała masa urodzeniowa ciała,
- masa urodzeniowa > 3,5 kg,
- wyrzynanie zębów < 5 m.ż.,
- niedojrzałość układu immunologicznego,
- choroby systemowe i upośledzenie umysłowe,
- częste zachorowania,
- stany gorączkowe i przyjmowanie leków w postaci lepkich syropów,
- zaniedbania higieniczne i błędy dietetyczne:
- sposób karmienia, karmienie piersią krócej niż 6 miesięcy i dłużej niż 12 miesięcy,
- podawanie słodzonego mleka, napojów lub odżywek przed snem.

Czynniki socjodemograficzne:

- męska płeć dziecka,
- uczęszczanie do szkoły publicznej,
- dochód rodziny,
- bezrobocie,
- niski poziom wykształcenia rodziców,
- samotna matka,
- więcej niż 3 osoby dorosłe
- więcej niż 2 dzieci w gospodarstwie domowym,
- pochodzenie etniczne,
- zawód rodziców,
- zamieszkanie na terenie wiejskim,
- matka niepracująca w pełnym wymiarze czasu,
- młody wiek matki,
- imigracja;

Czynniki higieniczne:

- wiek rozpoczęcia szczotkowania zębów,
- codzienne szczotkowanie zębów,
- częstotliwość szczotkowania zębów,
- udział bądź nadzór rodziców przy szczotkowaniu zębów,
- nieużywanie past z fluorem,
- zaniechanie czyszczenia zębów przed snem,
- widoczna płytka nazębna

- choroba dziecka powyżej tygodnia częściej niż 4 razy rocznie,
- brak kontroli pediatrycznej,
- hipoplazja szkliwa,
- wcześniejsza historia stomatologiczna,
- nieregularne kontrole dentystyczne,
- niewielka ekspozycja na związki fluoru,
- czas poświęcony przez dziecko na oglądanie telewizji,
- jedzenie dla poprawy nastroju,
- lekarstwa z cukrem przed snem,
- paląca matka,
- nieśmiałość dziecka,
- niski wzrost dziecka,
- ssanie smoczka powyżej 24. miesiąca życia

Inne czynniki:

- krótki sen dziecka,
- poziom fluoru w wodzie,
- wysoki przyrost ubytków próchnicowych u ojca,
- brak opieki matki przez długi okres,
- wiek pierwszego badania dentystycznego,
- rodzice z bezzębiem,
- wizyty matki u dentysty,
- występowanie bólów głowy u dziecka,
- stosowanie leków obniżających ilość śliny